

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pola penggunaan levofloksasin yang paling banyak ditemukan yaitu 1x750 mg melalui rute intravena dan azitromisin 1x500 mg per oral dengan lama penggunaan lebih dari 7 hari.
2. Terdapat pengaruh penggunaan kombinasi levofloksasin dan azitromisin sebelum dan sesudah penggunaan terhadap kondisi klinis pasien COVID-19 derajat ringan pada perbaikan parameter suhu, RR, batuk, serta sesak. Selain itu juga terdapat pengaruh penggunaan kombinasi levofloksasin dan azitromisin terhadap kondisi klinis pasien COVID-19 derajat sedang-berat pada perbaikan semua parameter yaitu suhu, RR, SpO₂, batuk, dan sesak.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang secara berkala agar penilaian atau pemantauan efek terapi lebih akurat.
2. Perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan prokalsitonin dan kultur bakteri pada uji laboratorium pasien sebagai penunjang perbaikan kondisi klinis serta sebagai pertimbangan penggunaan antibiotik untuk meningkatkan ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien COVID-19.