

## ABSTRAK

### GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU YANG MEMILIKI BALITA STUNTING DI WILAYAH PUSKESMAS SUMBANG 1

*Dhea Narantika, Erni Setyowati, Wahyudi Mulyaningrat*

**Latar Belakang:** Stunting merupakan dampak dari defisiensi nutrisi selama seribu hari pertama kehidupan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik ibu dengan balita stunting.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling* kepada 396 ibu yang memiliki balita stunting di wilayah Puskesmas Sumbang 1. Penelitian ini menggunakan lembar pengumpulan data. Analisa data penelitian ini menggunakan analisis univariat.

**Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden berusia >30 tahun (64,8%), dengan status pekerjaan tidak bekerja (92,0%) dan responden sebanyak (39,8%) dengan pendidikan terakhir yaitu SMP/Sederajat, responden memiliki tinggi badan <150 cm sebanyak (53,4%) dengan riwayat pemberian ASI eksklusif (68,2%). Responden sebanyak (50,0%) memiliki jumlah anak 2 dengan tipe keluarga inti sebanyak (56,8%).

**Kesimpulan:** Karakteristik ibu yang memiliki balita di wilayah puskesmas Sumbang 1 ibu dengan usia >30 tahun dengan status pekerjaan tidak bekerja/ibu rumah tangga dan memiliki pendidikan terakhir SMP, memiliki tinggi badan <150cm dengan riwayat pemberian ASI eksklusif secara eksklusif dan memiliki jumlah anak 2 dengan tipe keluarga inti.

**Kata kunci:** Stunting, karakteristik Ibu

## ABSTRACT

### DESCRIPTION OF THE CHARACTERISTICS OF MOTHERS WHO HAVE STUNTING TODDLERS IN THE AREA OF PUSKESMAS SUMBANG 1

*Dhea Narantika, Erni Setyowati, Wahyudi Mulyaningrat*

**Background:** Stunting is the impact of nutrient deficiencies during the first thousand days of life. factors related to stunting events can differ from region to region. This study aims to determine the characteristics of mothers with stunting toddlers.

**Methods:** This method usesn cross sectional approaches. Sampling using a simple random sampling technique to 396 mothers who had stunting toddlers in the Sumbang Health Center 1 area. This study used a data collection sheet. Data analysis of this study uses univariate analysis

**Results:** The results of this study showed that most respondents were >30 years old (64.8%), with a job status of not working (92.0%) and respondents (39.8%) with the last education, namely junior high school / equivalent, respondents had a height of <150 cm (53.4%) with a history of exclusive breastfeeding (68.2%). Respondents (50.0%) had 2 children with the nuclear family type (56.8%).

**Conclusion:** Characteristics of mothers who have toddlers in the Sumbang health center area 1 mother with the age of >30 years with a non-working work status / housewife and have the last education in junior high school, have a height of <150cm with a history of exclusive breastfeeding exclusively and have a total of 2 children with the nuclear family type.

**Keywords:** Stunting, maternal characteristics.