

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan bermakna PT antara pasien COVID-19 yang dirawat di ruang intensif dibandingkan dengan non intensif RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.
2. Terdapat perbedaan bermakna APTT antara pasien COVID-19 yang dirawat di ruang intensif dibandingkan dengan non intensif RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.
3. Terdapat perbedaan bermakna D-dimer antara pasien COVID-19 yang dirawat di ruang intensif dibandingkan dengan non intensif RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.

B. Saran

1. Penelitian lebih lanjut mengenai faktor risiko perubahan PT, APTT dan D-dimer pada pasien COVID-19 perlu dilakukan untuk membantu deteksi awal risiko gangguan koagulasi pada pasien COVID-19.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan PT, APTT dan D-dimer selama perjalanan penyakit untuk mengetahui bagaimana pola perubahan dan penggunaan PT, APTT dan D-dimer sebagai prediktor prognosis pada pasien COVID-19.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang melihat hubungan PT, APTT dan D-dimer dengan keluaran pasien untuk mengetahui apakah PT, APTT dan D-dimer dapat digunakan sebagai prediktor mortalitas pada pasien COVID-19.