

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Karakteristik pasien yang menggunakan oseltamivir sebagian besar mengalami tingkat keparahan sedang yaitu sebanyak 38 (54,28 %) pasien. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki merupakan populasi yang paling banyak dibandingkan dengan wanita yaitu masing-masing sebanyak 37 dan 33 pasien. Sebagian besar pasien berada dalam rentang usia 48-57 tahun sebanyak 22 pasien. Lalu darisemua total sampel, hipertensi merupakan penyakit penyerta yang paling banyak dialami pasien sebanyak 15 kasus.
2. Oseltamivir memiliki pengaruh terhadap pasien COVID-19, dibuktikan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemberian oseltamivir pada parameter suhu pada pasien derajat sedang-berat yaitu, parameter RR pada pasien tingkat keparahan sedang-berat, parameter demam pada pasien tingkat keparahan sedang-berat, parameter batuk pada pasien tingkat keparahan ringan maupun sedang-berat, dan parameter sesak pada pasien tingkat keparahan ringan maupun sedang-berat.

### B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penggunaan obat lain yang dipakai sebagai terapi gejala pasien COVID-19 terhadap terapi oseltamivir.
2. Perlu dilakukan pencatatan rekam medis yang lebih lengkap oleh pihak rumah sakit untuk memudahkan pengamatan kondisi pasien. Pencatatan data rekam medik menggunakan sistem komputer akan memudahkan pengamatan kondisi pasien.