

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kadar sIgA penderita gingivitis anak talasemia mayor lebih rendah dibandingkan penderita gingivitis anak non talasemia usia 12-17 tahun.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Bagi orang tua agar lebih memperhatikan kebersihan rongga mulut anak sebagai upaya pencegahan penyakit periodontal pada anak-anak khususnya kelompok dengan resiko seperti anak dengan talasemia mayor.
2. Bagi dokter gigi khususnya dokter gigi spesialis anak dapat melakukan tindakan pencegahan permasalahan gigi dan mulut khususnya pada anak dengan talasemia mayor. Dokter gigi dapat bekerja sama dengan dokter yang bertanggung jawab atas pasien talasemia mayor untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut dalam penanganan kesehatan gigi dan mulut pasien talasemia mayor. Dokter gigi dapat memberikan edukasi dan informasi kepada pasien talasemia mayor dan orang tua pasien mengenai kondisi yang mungkin dialami oleh pasien dan solusi atas kondisi tersebut.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kadar sIgA pada anak talasemia mayor, melakukan pemeriksaan elektroforesis untuk memastikan kondisi sampel tanpa talasemia, dan dapat menambahkan kelompok yang diteliti yaitu kelompok anak talasemia mayor tanpa gingivitis serta kelompok anak tanpa talasemia dan tanpa gingivitis.

