

Abstrak

GAMBARAN FUNGSI SEKSUAL PADA WANITA KANKER SERVIKS DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Esa Shofiantyna Putri¹, Lutfatul Latifah, Dian Susmarini²

Latar Belakang: Aspek seksualitas pada penderita kanker serviks akibat terapi kanker serviks dapat menyebabkan disfungsi seksual yang mempengaruhi kualitas hidup perempuan. Salah satu upaya untuk mengetahui gambaran fungsi seksual pada wanita kanker serviks yaitu dengan menggunakan kuesioner *Female Sexual Function Index* (FSFI). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi seksual pada wanita kanker serviks di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Metode: Desain yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Teknik sampling yaitu *consecutive sampling* yang terdiri 147 responden. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner *Female Sexual Function Index* (FSFI). Analisis data menggunakan univariat.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan rerata usia responden adalah 30-50 tahun, pendidikan terakhir yaitu SD (81,6%), tidak bekerja (81,6%), stadium II (63,9%), dan terapi kemoterapi (63,9%), disfungsi seksual (100%), domain fungsi seksual yaitu hasrat seksual (99,3%), rangsangan seksual (51,7%), lubrikasi vagina (65,3%), orgasme (64,6%), kepuasan (57,8%), kesakitan (76,9%).

Kesimpulan: Fungsi seksual responden mayoritas disfungsi seksual pada domain rangsangan seksual, lubrikasi vagina, orgasme, kepuasan, kesakitan.

Kata Kunci: Fungsi seksual, Disfungsi seksual, Kanker serviks.

¹Mahasiswa Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jendral Soedirman

²Dosen Keperawatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

DESCRIPTION OF SEXUAL FUNCTION OF CERVICAL CANCER WOMEN IN HOSPITAL PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Esa Shofiantyna Putri¹, Lutfatul Latifah, Dian Susmarini²

Background: Aspects of sexuality in patients with cervical cancer due to cervical cancer therapy can cause sexual dysfunction that affects the quality of life of women. One effort to determine the description of sexual function in women with cervical cancer is by using the Female Sexual Function Index (FSFI) questionnaire. The purpose of this study is to determine sexual function in women with cervical cancer in RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Methods: The study design used quantitative descriptive. The sampling technique was consecutive sampling which consists of 147 respondents. The questionnaire used is the Female Sexual Function Index (FSFI) questionnaire. Data analysis using univariate.

Result: The results of this study indicate the average age of respondent is 30-50 old, SD (81,6%), not working (81,6%), stage II (63.9%), and chemotherapy (63.9%), sexual dysfunction (100%), sexual function domains included sexual desire (99.3%), sexual stimulation (51.7%), vaginal lubrication (65.3%), orgasm (64.6%), satisfaction (57.8%), pain (76.9)..

Conclusion: The respondent's sexual function is the majority of sexual dysfunction in the domain of sexual stimulation, vaginal lubrication, orgasm, satisfaction, pain.

Keyword: Sexual function, Sexual dysfunction, Cervical cancer.

¹Student of Nursing Department, Faculty of Health Sciences, University of Jenderal Soedirman

²Lecturer of Nursing Department, Faculty of Health Sciences, University of Jenderal Soedirman