

ABSTRAK

FAKTOR YANG MEMENGARUHI PRAKTIK SUAMI DALAM MENCEGAH IBU HAMIL DARI PAPANAN ASAP ROKOK DI KABUPATEN BANYUMAS

Fahira Audina Putri¹, Arrum Firda Ayu Maqfiroch², Windri Lesmana Rubai²

Latar Belakang: Lebih dari 50% ibu hamil terpapar asap rokok didalam rumah. Suami memiliki tanggungjawab dalam memelihara kesehatan anggota keluarganya terutama ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi praktik suami dalam mencegah ibu hamil dari paparan asap rokok di Kabupaten Banyumas.

Metodologi: Penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*. Populasi merupakan suami yang memiliki ibu hamil di Kecamatan Purwokerto Selatan, jumlah sampel 130 diambil dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, dianalisis secara univariat, bivariat menggunakan *chi-square* dan multivariat menggunakan uji regresi logistik.

Hasil: Hasil menunjukkan sebagian besar berusia dewasa (67,7%), berpendidikan tinggi (37.7%), wiraswasta (30%), memiliki pendapatan diatas rata-rata (63.8%) dan merokok (56.2%). Faktor yang berhubungan yaitu efikasi diri ($p=0,000$), persepsi hambatan ($p=0,000$), persepsi manfaat ($p=0,036$) dan dukungan keluarga ($p=0,023$). Efikasi diri (OR 2,72) dan persepsi hambatan (OR 5,04) memiliki pengaruh terhadap praktik pencegahan paparan asap rokok pada ibu hamil.

Kesimpulan: Persepsi hambatan menjadi faktor yang paling memengaruhi praktik suami dalam mencegah ibu hamil dari paparan asap rokok di Kabupaten Banyumas

Kata Kunci: Paparan Asap Rokok, Suami, Ibu Hamil, Health Belief Model

¹ Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas, Jenderal Soedirman

² Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

FACTORS AFFECTING HUSBAND PRACTICES IN PREVENTING PREGNANT WOMEN FROM EXPOSURE TO SECONDHAND SMOKE IN BANYUMAS REGENCY

Fahira Audina Putri¹, Arrum Firda Ayu Maqfiroch², Windri Lesmana Rubai²

Intorduction: About 50% of pregnant women are exposed to secondhand smoke at home. The husband has the responsibility to maintain the health of his family members, especially pregnant women. This study aims to determine the factors that influence husbands practices in preventing pregnant women from exposure to secondhand smoke in Banyumas Regency.

Methods: A quantitative study with a cross-sectional approach. The population is husbands who have pregnant women in South Purwokerto, total sample of 130 sample is taken by *purposive sampling* technique. Data collection used is questionnaire, analyzed using univariate, bivariate using *chi-square* and multivariate using logistic regression .

Results: The results show that most are adults (67.7%), highly educated (37.7%), entrepreneur (30%), have above average income (63.8%) and smoke (56.2%). Related factors were self-efficacy ($p=0.000$), perceived barrier ($p=0.000$), perceived benefit ($p=0.036$) and family support ($p=0.023$). Self-efficacy (OR 2.72) and perceived barrier (OR 5.04) have an influence on the practice of preventing exposure to secondhand smoke in pregnant women

Conclusions: Perceived barrier is the factor that most influences husbands practices in preventing pregnant women from exposure to secondhand smoke in Banyumas Regency

Keywords: Exposure to Secondhand Smoke, Husband, Pregnant, Health Belief Model

¹ Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas, Jenderal Soedirman

² Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman