

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Distribusi diagnosis pasien dispepsia tunggal sebanyak 28,57% dan dispepsia dengan diagnosis lain sebanyak 71,43%.
2. Pasien dispepsia paling banyak ditemukan pada usia >55 tahun (54,29%) dan sebagian besar pasien dispepsia adalah perempuan (74,29%).
3. Pola penggunaan obat *proton pump inhibitor* (PPI) pada pasien dispepsia di Bagian Penyakit Dalam RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto meliputi :
  - a. Obat omeprazole (54,29%) dengan pemberian terbanyak melalui parenteral 1x40mg dan 2x40 mg (37,14%) dan lama terapi pemberian obat terbanyak pada rentang 8-14 hari (21,43%).
  - b. Obat lansoprazole (45,71%) dengan pemberian terbanyak melalui peroral 1x30mg (41,42%) dan lama terapi pemberian obat terbanyak pada >42 hari (15,71%).

### B. Saran

Perlunya tindak lanjut dari hasil penelitian ini oleh rumah sakit sebagai evaluasi secara berkala terhadap penggunaan obat PPI pada pasien dispepsia di Bagian Penyakit Dalam RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto