

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Rerata kadar hemoglobin pada pasien kanker ovarium sebelum menjalani kemoterapi *paclitaxel-carboplatin* yakni 11, 748 g/dl di RSUD Margono Soekarjo.
2. Rerata kadar hemoglobin pada pasien kanker ovarium setelah menjalani kemoterapi *paclitaxel-carboplatin* yakni 11,113 g/dl di RSUD Margono Soekarjo.
3. Terdapat perbedaan signifikan rerata kadar hemoglobin sebelum dan sesudah kemoterapi *paclitaxel-carboplatin* pada pasien kanker ovarium di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ( $p=0,000$ ).

### B. Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode cohort sehingga dapat mengambil informasi lebih lengkap dan dapat lebih menggambarkan kondisi penderita pasien kanker ovarium.
2. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan untuk meneliti efek kemoterapi *paclitaxel-carboplatin* terhadap kadar hemoglobin tiap siklus kemoterapi.
3. Pengambilan data di RSUD Margono Soekarjo diperbaiki sistem ekstraksinya sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengambilan data.