

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Rerata kadar hemoglobin pada pasien kanker serviks uteri stadium IIB-IIIB sebelum menjalani kemoterapi *neoadjuvant* siklus pertama regimen paclitacel-*carboplatin* yakni 11, 292 g/dL di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
2. Rerata kadar hemoglobin pada pasien kanker serviks uteri stadium IIB-IIIB setelah menjalani kemoterapi *neoadjuvant* siklus pertama regimen paclitacel-*carboplatin* yakni 10,460 g/dL di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
3. Terdapat perbedaan signifikan rerata kadar hemoglobin sebelum dan sesudah kemoterapi *neoadjuvant* siklus pertama regimen *paclitaxel-carboplatin* pada pasien kanker serviks uteri stadium IIB-IIIB di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ($p=0,000$).

B. Saran

1. Penelitian ini menggunakan data rekam medis dengan metode cross sectional sehingga kurang menggambarkan keadaan pasien secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode cohort sehingga dapat mengambil informasi lebih lengkap dan dapat lebih menggambarkan kondisi penderita pasien kanker serviks stadium IIB-IIIB.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan uji kadar hemoglobin pada pasien kanker serviks stadium IIB-IIIB dengan terapi selain kemoterapi *neoadjuvant* regimen *paclitaxel-carboplatin* sebagai perbandingan, serta durasi waktu penelitian diperpanjang, sehingga subjek penelitian lebih variasi.
3. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan untuk meneliti efek kemoterapi *neoadjuvant paclitaxel-carboplatin* terhadap kadar hemoglobin tiap siklus kemoterapi *neoadjuvant*

