

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prevalensi kejadian Retensio Urin Pasca Persalinan (RUPP) pada RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo tahun 2018-2023 adalah 1,42%.
2. Terdapat hubungan antara derajat luka perineum dengan RUPP pada RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo. Luka perineum derajat I berisiko 2,44 kali untuk terjadi RUPP daripada perineum intak, luka derajat II berisiko 6,841 kali untuk terjadi RUPP daripada perineum intak, luka derajat III berisiko 27,5 kali untuk terjadi RUPP daripada perineum intak.
3. Lama kala II berisiko 3,57 kali untuk terjadi RUPP
4. RUPP mempengaruhi lama rawat inap dengan rata-rata penambahan satu hari dari waktu normal ibu bersalin.

B. Saran

1. Disarankan dalam penulisan rekam medis dilakukan pencatatan yang lebih mendetail terkait dengan diagnosis sekunder, data demografi seperti usia, tingkat pendidikan, berat badan, pencatatan untuk sistem RKE dibuat lebih mendetail terkait kondisi ibu dan pencatatan waktunya.

2. Disarankan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut menggunakan sampel yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.
3. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode prospektif.
4. Disarankan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya dengan cakupan lokasi yang lebih luas agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi
5. Disarankan untuk memperhitungkan variabel perancu dalam penelitian lanjutan, dengan harapan dapat memperkuat hasil penelitian dan mengurangi bias. Beberapa perancu yang dapat diperhatikan seperti persalinan dengan menggunakan instrument, persalinan *cectio caecarea*, lama kala 1, dan episiotomi.

