

ABSTRAK

DETERMINAN PEMANFAATAN PELAYANAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DENGAN METODE IVA OLEH WUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS

Lidia Novianti, Yuditha Nindya Kartika Rizqi, Aarih Diyaning Intiasari

Latar belakang: Kanker serviks menjadi penyebab kematian kedua akibat kanker pada wanita di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target 80% wanita usia 30-50 tahun melakukan deteksi dini kanker serviks melalui metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Namun, cakupan IVA di Puskesmas Kebasen Kabupaten Banyumas masih rendah yaitu 2,2% pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis determinan pemanfaatan deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA oleh Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja Puskesmas Kebasen Kabupaten Banyumas.

Metode: Penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel berjumlah 102 WUS yang diambil dengan teknik *simple random sampling*. Analisis data menggunakan *uji chi square* dan regresi logistik berganda. Variabel penelitian ini terbagi menjadi 2 diantaranya variabel independen yang meliputi pengetahuan, sikap, paparan informasi, akses pelayanan kesehatan, dukungan keluarga, persepsi kebutuhan IVA tes dan variabel dependen adalah pemanfaatan pemeriksaan IVA.

Hasil Penelitian: Terdapat hubungan antara pengetahuan (*p-value* 0,016), sikap (*p-value* 0,001), paparan informasi (*p-value* 0,001), dukungan keluarga (*p-value* 0,001), persepsi kebutuhan IVA (*p-value* 0,007) dengan pemanfaatan pelayanan IVA. Terdapat pengaruh antara pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap pemanfaatan pelayanan IVA. Sedangkan faktor paling berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan IVA adalah dukungan keluarga dengan *p value* 0,005 dan OR 20,473.

Kesimpulan : Variabel dukungan keluarga berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan IVA. Oleh karena itu penyedia layanan kesehatan perlu meningkatkan dan mengembangkan kegiatan promotif dan preventif mengenai kanker serviks dan pemanfaatan IVA guna meningkatkan dukungan keluarga.

Kata kunci: Kanker Serviks, IVA Tes, Pemanfaatan

ABSTRACT

DETERMINANTS OF EARLY CERVICAL CANCER DETECTION SERVICE UTILIZATION USING THE VIA METHOD AMONG WOMEN OF CHILDBEARING AGE IN THE WORKING AREA OF KEBASEN HEALTH CENTER, BANYUMAS REGENCY

Lidia Novianti, Yuditha Nindya Kartika Rizqi, Arih Diyaning Intiasari

Background : Cervical cancer is the second leading cause of cancer death in women in Indonesia. The government has set a target of 80% of women aged 30-50 years to undergo early detection of cervical cancer through the Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) method. However, the coverage of VIA at the Kebasen Health Center, Banyumas Regency is still low, namely 2.2% in 2023. The purpose of this study was to analyze the determinants of the use of early detection of cervical cancer using the VIA method by Women of Childbearing Age (WCA) in the work area of the Kebasen Health Center, Banyumas Regency

Methods : Quantitative research with cross sectional approach. Samples amounted to 102 WCA taken using simple random sampling technique. Data analysis using chi square test and multiple logistic regression. The variables of this study are divided into 2 including independent variables including knowledge, attitudes, exposure to information, access to health services, family support, perception of the need for VIA tests and the dependent variable is the utilization of VIA examinations.

Results : There is a relationship between knowledge (p-value 0.016), attitude (p-value 0.001), information exposure (p-value 0.001), family support (p-value 0.001), perception of VIA needs (p-value 0.007) with the utilization of VIA services. There is an influence between knowledge and family support on the utilization of VIA services. While the most influential factor on the utilization of VIA services is family support with a p value of 0.005 and OR 20.473.

Conclusion : Family support variables affect the utilization of VIA services. Therefore, health service providers need to improve and develop promotive and preventive activities regarding cervical cancer and the utilization of VIA to increase family support..

Keywords : Cervical Cancer, VIA Test, Utilization