

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan skor fungsi kognitif pasien pasca stroke iskemik dengan dan tanpa diabetes melitus. Pasien pasca stroke iskemik dengan diabetes melitus berisiko 4-5 kali lebih tinggi mengalami penurunan fungsi kognitif dibandingkan pasien pasca stroke iskemik tanpa diabetes melitus
2. Terdapat faktor faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap skor fungsi kognitif pasien pasca stroke iskemik dengan dan tanpa diabetes melitus yaitu lama stroke dan jenis kelamin pasien

B. Saran

1. Bagi tenaga kesehatan, dapat dilakukan perencanaan penatalaksanaan diabetes melitus dengan tepat terhadap pasien pasca stroke iskemik untuk mencegah penurunan fungsi kognitif yang lebih progresif.
2. Bagi masyarakat, dapat dilakukan perubahan pola gaya hidup yang sehat disertai kontrol rutin ke dokter pada pasien pasca stroke iskemik dengan diabetes melitus untuk mencegah penurunan fungsi kognitif yang lebih progresif.
3. Bagi peneliti lain, dapat dilakukan penelitian selanjutnya dalam mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi fungsi kognitif pada pasien pasca stroke iskemik disertai lokasi dan luas lesi infark serta memperbesar sampel untuk meningkatkan nilai kemaknaan penelitian
4. Perlu dilakukan penelitian pada fungsi kognitif pasien pasca stroke iskemik dengan sampel usia dibawah 45 tahun dan diatas 65 tahun.