

Abstrak

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN PELAYANAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) OLEH PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS I SUMBANG

Sheruni Tri Hartanti, Devi Octaviana, Bambang Hariyadi

Latar Belakang : Hipertensi merupakan *silent killer* dengan gejala dapat bervariasi dan menyebabkan penyakit berbahaya. Pencegahan dilakukan dengan deteksi dini penyakit dengan memanfaatkan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Posbindu oleh penderita hipertensi di wilayah Kerja Puskesmas I Sumbang.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan *cross sectional study*, populasinya adalah penderita hipertensi dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *proportional random sampling* sebanyak 100 orang. Analisis penelitian terdiri dari analisis univariat, analisis bivariat dan analisis multivariat.

Hasil : Variabel yang memiliki pengaruh adalah dukungan sosial ($p = 0.002$), variabel yang tidak berpengaruh adalah penggunaan fasilitas kesehatan ($p = 0.997$), pengetahuan ($p = 0.611$), sikap ($p = 0.267$) dan persepsi sakit ($p = 0.116$).

Simpulan dan saran : Faktor dukungan sosial dapat mempengaruhi pemanfaatan Posbindu pada penderita hipertensi dan perlunya melakukan sosialisasi tentang posbindu sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas posbindu lebih baik dan perlunya dukungan sosial dari orang lain.

Kata Kunci : Hipertensi, Posbindu, Pemanfaatan Posbindu

Abstract

FACTORS INFLUENCING THE UTILIZATION OF INTEGRATED COACHING POST (POSBINDU) BY HYPERTENSION PATIENT IN SUMBANG I PUBLIC HEALTH CENTER

Sheruni Tri Hartanti, Devi Octaviana, Bambang Hariyadi

Background : Hypertension is a silent killer with symptoms that can vary and cause dangerous disease, prevention is done early detection of disease by utilizing the integrated Coaching Post of Non-Communicable disease (Posbindu PTM). The purpose of this study was to determine the factors that influence the utilization of Posbindu by hypertension patient in Sumbang I Public Health Center.

Methods : This research was quantitative with cross sectional study, the population is hypertension patients with samples are 100 people using proportional random sampling technique. The analysis of the study of univariate analysis, bivariate analysis and multivariate analysis.

Results : variables that affects is social support (0.002). variables that not affect is the use of health facilities (0.997), knowledge (0.611), attitudes (0.267) and perception of illness (0.116).

Conclusion and Suggestion: Social support factors can affect the use of Posbindu in hypertension patient (OR = 8.307) and there needs to be socialization about Posbindu so that people can use the Posbindu facilities better and the need for social support from others.

Keywords : Hypertension, Posbindu, Utilization of Posbindu