

PERBEDAAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN KARSINOMA NASOFARING YANG BERASAL DARI DESA DAN KOTA DI

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

ABSTRAK

Latar Belakang : Karsinoma nasofaring merupakan salah satu keganasan yang dapat menjadi stressor selama pengobatan. Belum ada adanya data tentang perbedaan kecemasan pada pasien karsinoma nasofaring yang berasal dari desa dan kota di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut untuk menekan terjadinya kecemasan pada pasien.**Tujuan Penelitian :** Mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada pasien karsinoma nasofaring di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo yang berasal dari desa dan di kota. **Metode :** Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Sampel yang diteliti adalah pasien Karsinoma Nasofaring yang berasal dari desa dan kota yang terdaftar di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi **Hasil :** Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* diketahui nilai chi-square sebesar 6,600 dengan nilai signifikan $\alpha = 0,05$, p value = 0,037. Karena nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak yang artinya ada perbedaan tingkat kecemasan pada pasien karsinoma nasofaring masyarakat desa dan kota di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Prof.DR. Margono Soekarjo tingkat kecemasasan pada masyarakat yang berasal dari kota lebih tinggi dibandingkan pasien yang berasal dari desa. Dan dari perhitungan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan pada pasien karsinoma nasofaring di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo yang berasal dari desa dan kota

Kata kunci : tingkat kecemasan, karsinoma nasofaring, desa dan kota

**DIFFERENCES IN THE LEVEL OF ANXIETY IN PATIENTS
nasopharyngeal carcinoma FROM THE VILLAGE AND TOWN
IN Hospital PROF . DR . MARGONO SOEKARJO**

ABSTRAC

Background: Nasopharyngeal carcinoma is a malignancy that can be a stressor during treatment. There has been no lack of data on the differences of anxiety in patients with nasopharyngeal carcinoma who came from villages and towns in hospitals Prof.Dr. Margono Soekarjo handlers need to get more to suppress the occurrence of anxiety in patients. **Objective:** To identify differences in the level of anxiety in patients with nasopharyngeal carcinoma in hospitals Prof.Dr. Margono Soekarjo from the villages and the town. **Methods:** The study design used in this study was observational analytic with cross-sectional approach. The samples studied are Nasopharyngeal Carcinoma patients from villages and towns were registered in hospitals. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto who meet the criteria for inclusion and exclusion **Results:** Based on the statistical test by using Chi-Square test known chi-square value amounted to 6,600 with significant value of $\alpha = 0.05$, p value = 0.037. Because the probability value <0.05 , then H_0 is rejected, which means that there are differences in the level of anxiety in patients with nasopharyngeal carcinoma in villages and town in hospitals Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. **Conclusion:** Based on the research results in hospital Prof.DR. Margono Soekarjo also known anxiety levels in people who come from cities higher than those coming from the village. And from calculations concluded that there are differences in the level of anxiety in patients with nasopharyngeal carcinoma in hospitals Prof.Dr. Margono Soekarjo coming from villages and towns

Keywords: levels of anxiety, nasopharyngeal carcinoma,village and town.