

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan pada 30 sampel dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang bermakna tingkat kecemasan pada pasien karsinoma nasofaring yang berasal dari desa dan kota di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
2. Tingkat kecemasan pada penderita karsinoma nasofaring yang berasal dari desa di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagian besar dalam kondisi ringan, yaitu sebesar 53,33%.
3. Tingkat kecemasan pada penderita karsinoma nasofaring yang berasal dari kota di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagian besar dalam kondisi sedang, yaitu sebesar 66,67%.

## **B. Saran**

1. Tingkat kecemasan pada penderita karsinoma nasofaring yang berasal dari kota di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagian besar dalam kondisi sedang, pasien disarankan meningkatkan interaksi baik dengan keluarga dan lingkungan sosial di sekitar pasien.
2. Sampel penelitian pada penelitian ini terjadi pengurangan sampel di karenakan keterbatasan waktu, kami menyarankan agar adanya penambahan atau perpanjangan waktu penelitian pada penelitian yang menggunakan sampel yang besar.
3. sampel yang digunakan adalah seluruh pasien karsinoma nasofaring dan belum di kelompokkan menurut stadium karsinoma nasofaring, Yaitu stadium 0, stadium I, stadium IIa dan IIb, stadium III, stadium IVa,IVb dan IVc. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti tingkat kecemasan pasien karsinoma nasofaring berdasarkan tingkat stadium karsinoma nasofaring.